

## Diagnosen neuer Arten brasilischer Handflügler.

Von

Dr. A. W a g n e r.

Seitdem ich die ersten Diagnosen neuer Arten brasilischer Sängthiere bekannt gemacht habe, ist mein Mitarbeiter, der Kustos-Adjunkt Johann Natterer, durch einen unerwarteten schnellen Tod der Theilnahme an der Bearbeitung der Fauna mammalium brasiliensium entzogen worden. Der beabsichtigten Arbeit geht dadurch ein bedeutender Verlust zu, als ein grosser Theil der von meinem Freunde gemachten Beobachtungen mit ihm zu Grabe getragen ist, und ich von nun an nur noch auf die in sein Tagebuch eingetragenen Notizen beschränkt bin. Die von ihm in Brasilien gesammelten Handflügler habe ich in einer Auswahl durch Herrn Kustos Natterer, dem Bruder des Verstorbenen, zur Ansicht erhalten. Nachstehend verzeichnete Arten halte ich für neu, und theile einstweilen von ihnen die Diagnosen mit. Unter den hier aufgeführten Arten ist *Phyllostoma callearatum* nicht von Johann Natterer gesammelt worden, sondern durch mich von dem Naturalienhändler Brandt für das hiesige Museum angekauft. Auch *Dyposes longimanus* habe ich schon früher in unserer Sammlung als eigne Art unterschieden.

### 1. *Phyllostoma longifolium* Natt.

*Ph.* supra fuscum, subtus pilis basi fuscis, apice flavidis; dorso stria longitudinali canescente notato; auriculis elongatis; prosthemate angusto longissimo; cauda elongata; patagio interfemorali amplissimo truncato.

Antibrachium 4" 9".

Villa Maria.

### 2. *Phyllostoma amblyotis* Natt.

*Ph.* castaneo-fuscum, subtus pilis bruneis, basi paululum .

albidis; auriculis amplissimis; cauda brevi, calcaribus longis, alis metatarso affixis.

Antibrachium 1" 10".

Mato grosso.

### 3. *Phyllostoma discolor* Natt.

Ph. bicolor, supra saturate castaneo-fuscum, pilis basi albidis, apice fuscis; gastraeo sordide albicante; capite supra castaneo; auriculis mediocribus, canda calcaribusque brevissimis.

Antibrachium 2" 2".

Cuyaba.

### 4. *Phyllostoma personatum* Natt.

Ph. supra fuliginoso-fuseum, subtus bruneo-canum; striis facialibus quatuor albis, stria tergalii vix distinguenda; cauda nulla, patagio interfemorali angusto.

Antibrachium 1" 10".

Ypanema.

### 5. *Phyllostoma pusillum* Natt.

Ph. minimum, fuliginoso-fuscum, subtus pallidius; striis facialibus quatuor albidis; cauda nulla.

Antibrachium 1" 2".

Sapitiva.

### 6. *Phyllostoma bilabiatum* Natt.

Ph. supra albido fuseoque marmoratum, subtus rubello-canescens; prosthimate dilatato, supra rotundato; apice styliformi terminato; labiis verrneis minimis limbatis; canda nulla, patagio interfemorali exciso.

Antibrachium 1" 6½".

Ypanema.

### 7. *Phyllostoma calcaratum* Wagn.

Ph. supra fuliginoso-fuseum, pilis basi albidis, apice fuscis; subtus brunescens, pilis basi canescentibus; prosthimate elongato, angusto, lanceolato; cauda brevissima, calcaribus longissimis.

*Antibrachium 1" 6"*.

Brasil. Mus. Monac.

**8. *Chilonycteris gymnonotus* Natt.**

Ch. fusca, dorso nudo.

*Antibrachium 1" 8½"*

Cuyaba.

**9. *Chilonycteris personata* Wagn.**

Ch. fusca, suptus dilutior, dorso piloso.

*Antibrachium 1" 8"*.

Mato grosso.

**10. *Chilonycteris rubiginosa* Natt.**

Ch. cinnamomeo-rufescens; auriculis elongatis, angustatis, acuminatis; patagio interfemorali amplissimo truncato.

*Antibrachium 2" 3"*.

Caiçara.

**11. *Emballonura macrotis* Wagn.**

E. auriculis amplissimis approximatis, transversim carinatis, rostro acuminato depresso; alis tarsum vix attingentibus.

*Antibrachium 1" 8"*.

Mato grosso.

**12. *Emballonura brevirostris* Wagn.**

E. auriculis abbreviatis latiusculis; rostro brevi tumido acuminato; alis metatarso affixis.

*Antibrachium 1" 8½"*.

Marabitanas.

**13. *Dysoptes longimanus* Wagn.**

D. saturate fuscus, auriculis elevatis, basi connatis; rostro abbreviato tumido, labro glabro; antibrachio elongato; alis longis nudis.

*Antibrachium 2" 2"*.

Villa Maria, Caiçara, Barra do Rio negro.

**14. *Dysoptes leucopleura* Natt.**

D. saturate fuscus; auriculis elevatis, basi connatis; rostro

abbreviato tumido, labro glabro; antibrachio elongato; alis longis nudis; ventre lateraliter taenia pilorum albidorum limbato.

Antibrachium 2" 4".

Caiçara. An varietas praecedentis?

#### 15. *Dysopes glaucinus* Natt.

D. supra castaneo-fuscus, subtus sordide rubello-canus; auriculis elevatis, basi connatis; labro glabro; alis longis, secundum antibrachii longitudinem paululum pilosis.

Antibrachium 2" 1½".

Cuyaba.

#### 16. *Dysopes holosericeus* Natt.

D. splendide et saturate castaneo-fuscus, pilis adpressis; auriculis minus elevatis dilatatis; antibrachio abbreviato; alis intus secundum antibrachii longitudinem dense pilosis.

An *Dysopes abrasus* Temm.?

Antibrachium 1" 11".

Rio de Janeiro.

#### 17. *Dysopes albus* Natt.

D. supra subtusque albidus; patagiis nigricantibus.

Antibrachium 1" 10".

Capit. Mato grosso.

#### 18. *Dysopes auritus* Natt.

D. supra subtusque saturate fuscus; auriculis amplis connatis, rostro attenuato, labro rugoso-crenulato.

An *Molossus coecus* Rengg.?

Antibrachium 2" 3".

Cuyaba.

#### 19. *Dysopes gracilis* Natt.

D. minutus, supra subtusque sordide bruneus; auriculis amplis connatis; labro rugoso-crenulato; alis midis, corpus versum puncturatis.

Antibrachium 1" 6".

Cuyaba.